


INFORMACIÓ PER A PACIENTS




CONSELLS PER A L'ADMINISTRACIÓ D'HEPARINES DE BAIX PES MOLECULAR (HBPM)




- Retireu el caputxó de goma.




- No en traieu l'aire, la xeringa és llesta per a ser administrada.




- El lloc de la injecció és la cintura abdominal. Canvieu cada dia el lloc d'aplicació. Desinfecteu la zona amb un cotó impregnat en alcohol.




- Agafeu un plec de pell entre els dits índex i polze.



- Mantingueu la xeringa cap per avall i introduïu l'agulla de forma vertical en tota la longitud del plec.



- Injecteu-ne lentament tot el contingut fins que no pugueu més.



- No fregueu la pell després de la injecció per evitar hematomes.



- Llenceu les xeringues al contenidor d'objectes punxants.

■ ADMINISTREU AVUI A PARTIR DE LES h.

■ DESPRÉS, CONTINUEU CADA 24 H. DURANT DIES.



INFORMACIÓN PARA PACIENTES




CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)




- Retirad el capuchón de goma.




- No saquéis el aire; la jeringa está lista para ser administrada.




- El lugar de la inyección es la cintura abdominal. Cambiad cada día el lugar de aplicación. Desinfectad la zona con un algodón impregnado en alcohol.




- Coged un pliegue de piel entre los dedos índice y pulgar.



- Mantened la jeringa hacia abajo e introducid la aguja de forma vertical en toda la longitud del pliegue.



- Inyectad lentamente todo el contenido hasta que no podáis más.



- No freguéis la piel después de la inyección para evitar hematomas.



- Tirad las jeringas al contenedor de objetos punzantes.

■ ADMINISTRAD HOY A PARTIR DE LAS h.

■ DESPUÉS, CONTINUAD CADA 24 H. DURANTEDÍAS.

